

26

รอยโรคในช่องปากอย่างไร

จึงบ่าสงสัยว่าเป็นโรคมะเร็งในช่องปาก

“ รอยโรคในช่องปาก ส่วนใหญ่
ของรอยโรคมักมองเห็นได้ ส่วนน้อย
มองไม่เห็น ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์โภวิทย์ พฤกษาณุศักดิ์
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ช่องปากเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย มีหน้าที่หลักหลาย หน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือ เป็นบริเวณเตรียมอาหารให้เหมาะสมแก่การกิน และการบดย่อยของกระเพาะอาหาร ช่องปากจะประกอบด้วยอวัยวะที่มีไว้เพื่อบดเคี้ยวอาหารให้ลละเอียด ต่อมน้ำลายที่ผลิตน้ำลายให้คุณค่าอาหารและย่อยสลายอาหารบางส่วน มีลิ้นที่ช่วยในการบดกระเพาะอาหารและการกิน นอกจากนี้ยังมีต่อมรับรสที่ช่วยให้เรารู้สึกว่าอาหารสดชื่นและเคี้ยวอร่อย หรือปฏิเสธอาหารบางชนิดที่อาจเป็นอันตรายกับร่างกาย เช่น รสขมหรือเผ็ดมาก ช่องปากยังเป็นทางผ่านของเสียงที่กำเนิดจากกล่องเสียง โดยมีอวัยวะในช่องปากร่วมกับช่องจมูกในการทำให้มีเสียงไพเราะ ส่วนมากออกเสียงได้หลักหลายในการลือภาษา

เมื่อเกิดรอยโรคในช่องปาก ส่วนใหญ่ของรอยโรคมักมองเห็นได้ ส่วนน้อยมองไม่เห็น รอยโรคที่มองไม่เห็นเมื่อใดซึ่งจะทำให้มีอาการเจ็บเวลา กิน ขยับลิ้นหรืออ้าปากหรือได้ลิ้นปาก เสียงเปลี่ยน กลืนอาหารลำบาก หายใจลำบาก เมื่อมีรอยโรคที่ทำให้เกิดอาการดังกล่าวควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อวินิจฉัยสาเหตุ

รอยโรคในช่องปากที่เรามองเห็นได้เมื่ออ้าปากมักอยู่บริเวณริมฝีปาก กระพุ้งแก้ม เหงือก ฐานของช่องปาก และถึง เมื่อมีอาการผิดปกติเพียงเล็กน้อยในผู้ที่สังเกตและดูแลสุขภาพของตนเองเป็นประจำมักพบแพทย์แต่เนิ่นๆ แต่ในผู้สูงอายุ รอยโรคอาจໂ拓ทยายเดือนก่อนมาพบแพทย์

รอยโรคหรือแผลลักษณะต่อไปนี้ควรมาพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยแต่เนิ่นๆ

1. เป็นแผลที่เป็นนานกว่า 3 สัปดาห์ แผลในช่องปากชนิดไม่ใช่มะเร็ง เช่น สาเหตุจากการอักเสบ แผลร้อนใน มักเป็นอยู่นาน 3-7 วัน แล้วหายไป และอาจเป็นใหม่ในที่ใหม่ แผลที่เป็นนานกว่า 3 สัปดาห์ โดยไม่มีแนวโน้มดีขึ้น ควรได้ปรึกษาแพทย์
2. แผลเรื้อรังที่เกิดจาก การกระแทกซ้ำๆ เช่น แผลที่เกิดจากพั้นกรรมที่แหลมคม หรือมีฟันปลอมที่หลวม แผลลักษณะนี้ถ้ารับประทานยาแก้อักเสบแล้วไม่ดีขึ้น ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยด้วยการตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา
3. แผลเดี่ยวที่มีขนาดขยายขึ้น แผลจากการอักเสบในปากมักเป็นทั่วๆ ไป แต่ถ้าเป็นแผลเดี่ยวและขอบเขตขยายออกให้คิดถึงแผลจากเนื้อร้าย

4. แพลที่มีขอบบุบบุบแข็ง ตรงกลางแพลเป็นแพลลีกหรือตื้น แพลดังกล่าวมักเกิดจากโรคร้าย
5. แพลที่มีลักษณะเหมือนดอกกระหลา และมีขนาดขยายขึ้น ให้คิดถึงสาเหตุจากมะเร็ง
6. รอยฝ้าขาว รอยฝ้าขาวในช่องปากมักเป็นสาเหตุที่ผิดปกติ เช่น จากเชื้อรา การเสียดสีนานๆ ของฟันและกระพุ่งแก้ม หรือที่เป็นรอยฝ้าก่อนเกิดมะเร็ง ฝ้าขาวจากเชื้อรากทำให้มีอาการแสบคันในช่องปากและคอ ส่วนรอยฝ้าก่อนเกิดมะเร็งมักไม่ทำให้เกิดอาการใดและจะไม่หลุดออก เมื่อถูหรือขัดเบาๆ

นอกจากทราบถึงรอยโรคอันตรายแล้ว ควรรู้ถึงการดูแลรักษาสุขภาพตนเองเพื่อให้ปลอดจากการเกิดรอยโรคอันไม่พึงประสงค์ต่อไปนี้

1. งดการสูบบุหรี่และดื่มสุรา
2. ดูแลรักษาสุขอนามัยในช่องปากอย่างสม่ำเสมอ
3. กำจัดสาเหตุที่ทำให้เกิดแพลเรื้อรังในปาก เช่น มีฟันที่แหลมคม ฟันปลอมที่ไม่แน่น การเคี้ยวมาก และรับประทานของร้อนจัดบ่อยๆ
4. ดื่มน้ำที่สะอาดให้เพียงพอ รับประทานผักสด ผลไม้ และผักตระกูลดอกกระหลา ซึ่งมีการวิจัยว่ามีสารบัญ้มะเร็ง เช่น บร็อกโคลี กะหล่ำปลี กระหล่ำดาว กะหล่ำปลี กระหล่ำดาว และผักกาดเขียว เป็นต้น
5. งดอาหารที่อาจมีสารก่อมะเร็ง เช่น อาหารหมักดอง ถั่วลิสงบด ปลาเค็ม
6. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

หากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ หรือว่าผู้อ่านคงพอจะสังเกตแพลงอย่างง่ายๆ ในช่องปากว่ามีลักษณะอย่างไร จึงต้องรีบไปพบแพทย์ และคงดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อป้องกันการเกิดรอยโรคดังกล่าว ซึ่งมีความสำคัญกว่าการรักษาเมื่อเกิดรอยโรคขึ้นมาแล้ว